

linear, algo arqueada, sobre pedúnculos de 5 mm. i el estilo de 1.5 mm. Tallo 0.04-0.05 m.

Cordilleras de Coquimbo i de Santiago. 4000 m.

Var. *suffruticosa* Barn. Gay I, páj. 157 (como especie). Se distingue por sus tallos mui leñosos i enlazados en la base, por sus hojas lineares, *alargadas* (hasta 7 mm.), bordadas de pestañas tiesas, vellosas solamente en la parte superior i por los racimitos cargados de unas pocas hojitas. Pedúnculos de las silículas inferiores hasta 2.5 cm. Tallo 0.05-0.1 m.

Cordilleras de Coquimbo hasta el Estrecho de Magallanes. Diciembre i Enero.

14. D. TENUIS Barn. Gay I, páj. 156.

Plantita pequeña, *pelada* o mui lijeramente vellosa, ramosa, con las hojas radicales indistintamente rosuladas, oblongas, enteras o escasamente dentadas. Las hojas tallinas de la misma forma. Pedúnculos mas largos que las flores, engrosados hácia el extremo. Silícula 2-3 mm. sobre pedúnculo de 6-7 mm., *pelada, desprovista de estilo*. Tallo 0.04-0.05 m.

Cordilleras de Coquimbo i de Ovalle.

22. *Agallis*.—Phil.

Pétalos amarillos. Racimo con hojas. Silícula comprimida desde los costados, con el disepimento angosto i con 4-6 semillas en cada celda. Embrion notorizado. Yerba con las hojas pinatífidas. Una especie chilena.

1. A. MONTANA Phil. Linnæa XXXIII, páj. 12. Tal vez el *Lepidium lanatum* Barn?

Planta *anual*, cubierta de pelos ásperos i sencillos. Hojas pinatipartidas con las pínulas 3-5—dentadas. Pétalos dos veces tan largos como los sépalos. Silículas vellosas, elípticas, 7-8 mm. de largo sobre 3 mm. de ancho, pedúnculos de 5-8 mm. Estilo de 1 mm. Tallos 0.08-0.2 m.

Provincia de Aconcagua (Catemu) i de Santiago (Cerros San Cristóbal i Moquehue cerca de la capital). Setiembre i Octubre.