hojas amontonadas en roseta, pinatífidas, con las pínulas obtusas i dentadas. Sépalos vellosos; estambres 2. Silícula orbicular, escotada. Semillas surcadas.

Cordillera de Coquimbo. 3,300 m. Noviembre.

† 11. L. RACEMOSUM Grisebach.—Véase Anal. Univ. Santiago, 1893., vol. 81. páj. 334.

Planta anual, con los tallos desparramados i vellosos. *Hojas pinatipartidas*, segmentos en corto número, oblongo-lineales, algo puntiagudos, los inferiores con frecuencia con un corto diente ante su punta, los superiores mui enteros. Racimos con las flores apretadas. *Pedúnculos arqueados*, tan largos como las silículas. Pétalos nulos; estambres 2; silículas ovaladas-orbiculares, cortamente escotadas. Estigma sésil.

Punta Arenas i otros lugares del Estrecho de Magallanes.

? 12. L. RUDERALE L.—Gay I, páj. 163.

Planta fétida, anual, mui ramosa. *Hojas inferiores pinadas* o bipinadas; *las tallinas lineares, enteras.* Flores pequeñísimas, pétalos a veces nulos, estambres 2. Silículas pequeñas, sin alas o cortamente aladas. Pedúnculos el doble mas largos que las silículas. Tallo 0,15-0,3 m.

Planta cosmopolita pero seguramente mui escasa en Chile. (Las muestras raquíticas i enanas del Museo no admiten clasificacion exacta).

* Var. *myrianthum* Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, pájina 5, número 21. (como especie).

Planta fétida, probablemente anual, *mui ramosa i despilfarrada;* las hojas tallinas son lineares i *escasamente dentadas. Racimos multifloros. Silículas elípticas*, poco escotadas, *tan largas como el pedúnculo.*

Provincia de Tarapacá (Cueva de Colorados). 3,880 m.

2. *Coronopus* Gaertn.

Flores pequeñas, blancas, dispuestas en racimos cortos. Silícula formada de dos cocos indehiscentes i de cáscara gruesa i

arrugada; estigma sésil. Embrion notorizado con los cotiledones plegados.—Yerbas anuales, fétidas, con los tallos tendidos.—12 especies, principalmente de la zona subtrópica; 1 especie en Chile.

PINNATIFIDUS (D. C.) Gärtn. *(Senebiera pinnatifida D. C.).* Gay I, páj. 174.

Planta fétida, ramosísima i medio tendida al suelo, bien vestida de hojas sésiles, pinatífidas, con los lóbulos inciso-dentados, racimos numerosos, vellosos. Flores pequeñas, corola blanca, apénas tan larga como el cáliz; estambres 2. Tallos 0.05-0.25 mm.

Lugares incultos, veredas, acequias en toda la República, hasta la Tierra de Fuego. Setiembre a Diciembre.

Var. *australis* Hook. fil. (como especie); con las silículas 2 veces mas grandes i finamente reticuladas. *Archipiélago de Chonos.*

Observacion. Coronopus Ruellii All. parece que no se encuentra en Chile.

7. *Thlaspi* L.

Pétalos blancos Silícula oblonga o elíptica, sus valvas frecuentemente aquilladas i ribeteadas, i con escotadura en el medio. Semillas 2, hasta varias. Semillas con el embrion pleurorizado. Yerbas anuales o perenes con las hojas enteras, peladas; las tallinas abrazadoras.—60 especies, principalmente en el mundo antiguo, unas pocas en América; en Chile 6 (?).

A. Silícula escotada.	
I. Silícula no alada.....	1 *glaucophyllum*
II. Silícula alada hácia el estremo.	
1. Pétalos mas largos que sépalos; 3 semillas en cada celda.	2 *andícola*
2. Pétalos tan largos como sépalos. 4 semillas.....	3 *magellanicum*
B. Silícula no escotada.	
I. Silícula troncada en el ápice.....	4 *gracile*