

tes, cada celdilla con muchos óvulos. Disco grueso. Estilo alesnado. Fruto una cápsula septicida con pocas semillas chatas i angulosas. Arbusto ramoso con las hojas opuestas, pinadas, las hojuelas en 5-6 parejas i sembradas de glándulas negras. Estípulas cortas, persistentes. Flores solitarias en las axilas. Una especie chilena.

\* I. P. CHILENSIS Gay, I, páj. 480, tab. 16.—Phil., Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 1,105.

Las ramas i hojas nuevas cubiertas de pelos blancos. Cápsulas cabizbajas (algo parecidas a las de *Cleome chilensis*). El porte de las hojas, el número i la intensidad de color de las glándulas varían muchísimo.

Provincia de Atacama. Setiembre.

#### 4. *Bulnesia*.—Gay

Sépalos 5, algo desiguales, caedizos. Pétalos 5, cortamente unguiculados, amarillos. Estambres 10, los filamentos provistos de una escama grande i tridentada en el ápice i de otras 2 pequeñas en ámbos lados de la base. Ovario 5—lobulado, alado, con 8 óvulos en cada celda. Un estilo. Fruto una cápsula que se deshace en 5 carpelos monospermos, membranosos, alados en el dorso i abiertos en la sutura ventral. Semillas oblongo-reniformes. Endospermio cartilajinoso. Arbusto con las hojas pinadas i las flores solitarias o en panículas. — 6 especies de la República Arjentina i de Chile (1 especie).

\* I. B. CHILENSIS Gay, I, páj. 475, tab. 15 (*Gonoptera chilensis* Turcz, Bull. Mosc., XIX, páj. 150). "Retama".

Arbusto con las ramas abiertas i vellosas. Hojas pinadas de 3-4 parejas de hojuelas ovaladas, de 8 mm. de largo. Estípulas cortas, triangulares. Cápsula de un verde-amarillento, de 1,5 cm. de largo sin el pedúnculo. Las hojas caen al madurar los frutos. Tallo 0,6-0,9 m.

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Setiembre, Octubre.

#### 5. *Larrea*.—Cav.

Sépalos 5, algo desiguales, caedizos. Pétalos 5, amarillos. Estambres 10, los filamentos apendiculados en la base por una es-