Especie problemática

9. B. NIGRIPETALA Clos en Gay III páj. 71.

Planta anual, cenicienta. Tallo derecho, delgado, sencillo o dicótomo. Hojas pocas, pecioladas, tomentosas, arriñonado-orbiculares, con 3-6 lóbulos poco profundos i obtusos. Umbelas de 2-6 flores pediceladas. Pétalos estendidos, negruzcos (en la planta seca). Frutos bastante grandes, cubiertos de pelos estrellados rojos. Talvez esta especie se estableció sobre una muestra discrepante o mal conservada de la Seccion I; segun el Ind. Kew. es idéntica con *Homalocarpus bowlesioides* Hook. et Arn. (Gay III páj. 93).

Comun en las cordilleras bajas.

Bowlesia crenata Desv. = *Dysopsis glechomoides* Baill.

4. *Laretia.*—Gill. et Hook.

Flores ☿. Cáliz 5-dentado. Pétalos aovado-oblongos. Estilos filiformes. Frutos mui grandes. Mericarpios fuertemente comprimidos desde el dorso, las costillas laterales en forma de alas anchas. Comisura angosta.—Yerbas perennes, dispuestas en céspedes densos. Las flores agrupadas por varias brotan entre medio de las hojas supremas. 2 especies de Chile. "Llareta."

I Hojas de 1,5-2,5 cm. de largo. Ramas no prismáticas..... 1. *acaulis*
II Hojas de 4-5 mm. de largo. Ramas prismáticas..... 2. *compacta*

1. L. ACAULIS Hook. Bot. Misc. I páj. 329, tab. 65.-Gay III páj. 106. (*Selinum acaule* Cav. *Mulinum acaule* Pers.)

Hojas peladas, arrosetadas, cuneado-oblongas agudas u obtusas, a veces resinosas, de 1,5-2,5 cm. de largo. Flores 6-10. Pétalos amarillos. Frutos amarillentos, a veces algo rojizos, de 1 cm. de largo sobre 1,2 cm. de ancho.

Cordilleras altas de Coquimbo hasta Talca; tambien en las cordilleras de Nahuelbuta; en la cordillera de Santiago desde 2,400-3,200 m.