característico para los montes i matorrales de la rejion magallánica, cubriéndose en Enero i Febrero de millares de flores blancas. Hállase tambien en las Islas Malvinas.

2. C. ROSMARINIFOLIUM Less. Linnaea VI (1831) páj. 109.—Gay IV páj. 7; Wedd. Chlor. and. I tab. 35-A; (*C. amelloides* var. γ Nees; (*C. Feliciae*, *C. ovatifolium* Hombr. et Jacq.; *Amellus rosmarinifolius* Poepp.; *C. longifolium* Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 401.

Como la especie anterior, pero la ramificacion aun mas tupida, las ramas mas delgadas i ménos tomentosas. *Hojas lineares o angostamente trasaovado-lineares*, de 3 cm. de largo sobre 1,5 mm. de ancho, ± glanduloso-punteadas.

Cordilleras de San Fernando etc. hácia el sur, todavía en la Patagonia; su área no está todavía bien deslindada con la de la especie anterior.

Var. *glabrescens* Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 401; (*C. angustifolium* Phil. l. c. páj. 401; *C. tenue* Phil. l. c. páj. 402).

Las ramas nuevas, los pedúnculos i las hojuelas del involucro casi peladas, de todas maneras no blanco-tomentosas. Las hojas de la misma forma algo variable del tipo.

En las cordilleras de Curicó, de la Araucanía.

Clave de las *Astéreas-Conyzinas*.

I. Flores periféricas ♀ en 2 a varias filas..... 21. *Conyza* (1)
II. Flores periféricas ♀ uniseriadas; cabezuelas amarillas..... 22. *Chroilema*

? 22. *Chroilema*.—Bernh.

Cabezuela heterógama, multiflora, discoídea. Involucro de varias filas de hojuelas imbricadas; las esteriores tendidas, las interiores levantadas con los bordes membranosos, colorados.

(1) El jénero *Conyza* ya se trató en combinacion con *Erigeron*.

Receptáculo alveolado. Flores esteriores uniseriadas ♀, tubulosas, con el limbo hendido. Las flores del disco ☿ tubulosas con el limbo 5-dentado. Aquenios comprimidos, oblongos, con pelos recostados. Vilano biseriado, los pelos esteriores cortos, los interiores del largo de la corola, denticulado-híspidos.—Arbustito chileno.

1. C. SUBCANESCENS Bernh. Sel. sem. hort. Erfurt 1840; Linnaea XV (1841) Lit. páj. 90.—Gay IV páj. 69.

Arbustito blanquecino-tomentoso. Hojas alternas, enteras, lineares; las inferiores hasta 5 cm. de largo; las superiores mas cortas. Cabezuelas solitarias, terminales en las ramitas, de color amarillo que por fin pasa al purpúreo.

Esta planta se conoce solamente criada de semillas procedentes de Chile. Con tal que esta indicacion sea exacta, talvez se trata de una especie de *Haplopappus*, algo modificada por el cultivo; compare *H. canescens* (Phil.)

APÉNDICES I ENMENDACIONES PARA LOS TOMOS I, II, III (1)

TOMO I

Ranunculáceas

En la esposicion del jénero *Ranunculus* han de introducirse las modificaciones siguientes:

Páj. 12. *R. biternatus* Sm. no tiene la corola blanca, como dice DC., sino amarilla (Explor. Exped. XV páj. 6) i parece idéntico con *R. obtustlobus* Phil.

Páj. 14. Núm. 7. *R. monanthos* Phil. es idéntico con núm. 8 *R. trullifolius* Hook. Este último tiene las flores pentámeras, véase Flora antarct. tab. 82.

Páj. 16. Núm. 15. *R. uniflorus* Phil. es idéntico con *R. Bovei*

(1) Véase tomo I, páj. 357; tomo II, páj. 371.