

2, cortos, de largo marcadamente desigual; estigmas en forma de disco. Cápsula subglobosa, según parece indehisciente i que se abre irregularmente. Semillas 2-4.

Cordilleras de Santiago, sobre *Laretia acaulis*, ca. 2,500 m.

Especies problemáticas

(1) *C. GRANDIFLORA* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. III páj. 123 tab. 213.

Esta especie de la región tropical de Sud-América se conoce por sus flores grandes i desprovistas de escamas en el tubo corolar. Según Engelm. páj. 84 se halla también en Chile, lo que no parece efectivo.

(2) *C. CUSPIDATA* Engelm. l. c. páj. 99, 105 es de Texas; según Walp. Annal. III páj. 117 se observó en Chile; pero no se indica en qué observación se funda esta aseveración.

Subfamilia 2: *Dicóndreas*

2. *Dichondra*.—Forst.

Sépalos separados desde la base, frecuentemente espatulados. Corola anchamente acampanada, 5-lobulada. Estambres 5, mas cortos que la corola. Ovario bipartido, con 2 óvulos en cada división. Estilos 2, ginobásicos entre medio de las porciones del ovario; estigmas en cabezuela. Cápsulas membranosas, irregularmente dehiscentes, con 1-2 semillas.—Plantas rastre-ras, $\pm$ peludas, con las hojas arríñonadas. Flores pequeñas, solitarias, axilares, con las corolas verdoso-amarillentas; el ovario muy peludo.—Las 4-5 especies en las regiones tropicales i subtropicales de todo el globo; por *Hallier* ya se reducen a 2 i talvez podrían unirse en una sola especie polimorfa, como lo propone *O. Kuntze* Rev. Gen. III páj. 216.

1. *D. REPENS* Forst. Gen. páj. 39 tab. 20.—Gay IV páj. 444 (*Sibthorpia evolvulacea* L.; *D. evolvulacea* Britton sec. Kuntze l. c.)

Planta perenne con el tallo tendido, peludo. Hojas arríñonadas o $\pm$ menos orbiculares con la base acorazonada, pubescente, tomentosas o sedosas en la cara inferior, pecioladas. Flores

sobre pedúnculos cortos, cáliz de 2 mm. de largo, corola algo mas corta que él. — Las cápsulas al madurar se entierran.

De dispersion lata en Asia, Africa, América; en Chile desde Coquimbo a Valdivia, en la zona litoral i en el interior. Octubre a Diciembre.

Observacion. De esta especie polimorfa de Chile se citan las variedades o formas siguientes: Var. *sericea* Choisy, DC. Prodr. IX páj. 451 con las hojas inferiormente sedosas; var. *microcalyx* Hallier, Engl. Jahrb. 18 (1894) páj. 84 con las hojas en ámbas caras recostado-pubescentes, arrifionadas, mas anchas que largas; sépalos obtusos, mas cortos que los ovarios. Tambien se indican de Chile *D. macrocalyx* Meissn. Flor. bras. fasc. 48 páj. 358 que de la var. anterior difiere por sus sépalos mas largos que los ovarios, i *D. argentea* Willd. con la base cuneada de sus hojas, el ápice retuso; ámbas caras de la lámina sedosas; la corola mas larga que el cáliz. Las muestras conservadas en el Mus. Nac. tienen sus sépalos obtusos i durante la floracion mas largos que los ovarios; las hojas o son pubescentes i entónces a veces grandes, delgadas, largamente pecioladas; o son blanco-sedosas por debajo i de dimensiones reducidas, pero sobre peciolos de largo variable. En vista de esta variabilidad admito una sola especie, la *D. repens* Forst., incluyendo tambien la *D. macrocalyx* Meissn. y *D. argentea* Willd. — *Aecidium Dichondrae* Neger Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 49-52, alarga los peciolos i reduce las láminas.

Subfamilia 3: *Dicranostileas*.

3. *Evolvulus*.—L.

Sépalos 5, iguales entre sí. Corola de forma variada (infundibuliforme, tubulosa, acampanada o rotácea), con el limbo plegado i 5-lobulado. Estambres 5, anteras aovadas u oblongas; los granos de pólen globosos, adornados de pliegues que determinan una red dodecaédrica. Disco poco desarrollado. Ovario (1-) 2-locular, con 2 óvulos en cada celda. Estilos 2, cada uno partido en 2 ramas delgadas que terminan en estigmas lineares. La cápsula se abre en 4 valvas i contiene (1-) 4 semillas lampiñas. — Plantas herbáceas, anuales o perennes, a veces leño-