lumna. Disco epíjino. Ovario ínfero, ± bilocular (hasta unilocular), bicarpelar; los óvulos numerosos, de placentacion axilar hasta central. Estilos con 2 estigmas cortos. El fruto es una cápsula dehiscente o indehiscente. — Los 3 jéneros de esta familia (con casi 100 especies) se hallan en el hemisferio austral (principalmente en la Oceanía); escasas en la parte tropical de Asia; en Chile 1 jénero.

1. *Phyllachne.* — Forst.

Cáliz (soldado con el ovario ínfero) de 5-7 divisiones. Corola infundibuliforme, de 4-9 divisiones ± iguales. Disco de 2 glándulas epíjinas. Columna estaminodial derecha. Ovario trasovóide-turbinado, imperfectamente bilocular en la base. Cápsula turbinada, indehiscente, polisperma. — Hierbas bajas en céspedes densos. Hojas pequeñas, atejadas. Flores solitarias, sésiles entre las hojas supremas. — De las 9 especies 8 son de la Nueva Zelanda, 1 de la rejion antártica de Chile.

Seccion *Helophyllum* Hook. fil. (como jénero.)

1. P. ULIGINOSA Forst. Char. gen. páj. 116 tab. 58. — Gay IV páj. 319; (*Forstera muscifolia* Willd., *F. uliginosa* Hombr. et Jacq. Voyage au pôle Sud, páj. 35 tab. 16.)

Planta pelada, dispuesta en céspedes bajos. Tallos fasciculado-ramosos, densamente vestidos de hojas linear-alesnadas, con las márjenes enteras o lijeramente almenadas, de 2 mm. de largo. Flores terterminales, sésiles, hermafroditas i unisexuales. Corola blanca, 5-6 partida. Los órganos sexuales mas largos que la corola.

Desde el Archipiélago de los Chonos hasta la Tierra del Fuego (parte austral i occidental, desde la zona litoral hasta 700 m., en localidades pantanosas.)

61. Familia. — CAMPANULÁCEAS

Flores hermafroditas, actinomorfas o cigomorfas. Tubo calicinal unido al ovario inféro, con el limbo jeneralmente 5-partido. Corola simpétala de 5 divisiones; cuando cigomorfa, a ve-