

dio partido en 5 divisiones triangulares, agudas. *Corola blanca*, del triple largo del cáliz. Frutos desconocidos.

Provincia de Antofagasta (Taltal). Octubre a Diciembre.

*Observacion 1.* El *Teucrium Scorodonia* L., planta herbácea, peluda con las flores solitarias en las axilas de las brácteas i reunidas en racimos unilaterales; las corolas amarillentas. Esta planta europea casualmente se introdujo a Valdivia en 1881 (Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 566).

*Observacion 2.* *T. cubense* L., no se encuentra en Chile. De *T chilense* Desf. Hort. Par. ed. 3. páj. 433 la diagnóstico es inaccesible en Chile; seguramente se trata de una planta conocida bajo otro nombre.

*Observacion 3.* A las Ajugoídeas pertenece tambien *Rosmarinus officinalis* L., el romero, planta de cultivo que proviene de Sud Europa.

Subfamilia segunda: *Escutellarioidéas*.

## 2. *Scutellaria*.—L.

Cáliz acampanado, bilabiado, el labio posterior caedizo, en el dorso provisto de una escama hueca; el anterior plano, persistente. Tubo corolar saliente, algo encorvado; el labio posterior corto, derecho, el anterior 3-lobulado. Estambres 4, didínamos, las anteras de los posteriores (mas largos) de 1 bolsita. Las 2 ramitas del estigma desiguales. Nuecesitas sub globosas, ± arrugadas, sentadas sobre un receptáculo (disco) alargado a manera de jinóforo.—Plantas herbáceas o leñosas con las hojas enteras o partidas, los verticilastros bifloros.—Ca. 180 especies esparcidas sobre el globo, en Chile 2 especies.

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| I. Tallos erguidos con las hojas oblongo-lanceoladas, auriculadas.....   | 1 | <i>rumicifolia</i> .    |
| II. Tallos tendidos con las hojas oblongo-elípticas, no auriculadas..... | 2 | <i>nummularioides</i> . |

1. *S. RUMICIFOLIA* H. B. Kth. Nov. gen. et sp. II páj. 324.  
—Gay IV páj. 495.

Planta perenne, muy ramosa, pelada, de un verde claro. Ramas delgadas, hojas inferiores cortamente pecioladas, *oblongo-lanceoladas, agudas, hacia la base auriculadas* i por eso algo alargadas, de 2-3 cm de largo. Las hojas superiores sucesivamente mas cortas i no auriculadas. Flores numerosas, formando racimos largos, flojos i unilaterales, son solitarias i pedunculadas en las axilas de las hojas. Cáliz de un verde rojizo, durante la floracion de 2 mm. de largo. Corola del doble largo del cáliz, *de un morado rojizo*. Nuecesitas tuberculadas, verdosas. Tallos 0,2-0,4 m.

Desde la zona litoral de la provincia de Valparaiso hasta Valdivia, en localidades húmedas. Noviembre a Enero.—Tambien en Méjico, Perú, el Brasil, Uruguay, Argentina.

+ 2. *S. NUMMULARIIFOLIA* Hook. Flor. antarct. páj. 336.—Gay IV páj. 496; (*Cruzia serpyllacea* Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 558).

Subarbustito elegante, peludo, de muchos tallos delgados, tendidos al suelo. Hojas *elíptico-oblongas* hasta casi orbiculares, *muy obtusas*, atenuadas hacia la base, algo glandulosas; las inferiores de 1 cm. de largo. Flores pedunculadas, solitarias en las axilas de las hojas medianas i superiores. Cáliz de 3 mm. de largo. *Corola de un rojo intenso*, del triple largo del cáliz. Nuecesitas maduras desconocidas. Tallos 0,08-0,15 m.

En la Patagonia austral (p. e. Ultima Esperanza), Tierra del Fuego. Diciembre a Enero.

Subfamilia tercera: *Estaquidoideas*.

a) *Estaquidoideas*.—*Marrubieas*.

3. *Marrubium*.—L.

Cáliz tubuloso, recorrido por 5-10 nervios i terminado en 5-10 dientes agudos i por fin arqueados a fuera; a veces con dientecitos mas cortos intercalados. Tubo corolar con un anillo de pelos en el interior, oculto en el cáliz, el limbo bilabiado;