

Plantita anual, pelada con el tallo sencillo, ramoso. Hojas alternas, oblongo-ovadas, atenuadas hacia la base, enteras, obtusas o apiculadas, hasta 5 mm. de largo. Flores solitarias, axilares, en las muestras chilenas siempre sésiles (mientras que en *C. pentandrus* han de ser pedunculadas). Divisiones calicinales 5, alesnadas, de 2 mm. Corola hipocraterimorfa, blanca, con 5 divisiones lanceoladas. Cápsula globosa. Tallos 0,02-0,08 m.

Plantita primaveral, en localidades pastosas desde la zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo) hasta Valdivia; también en el interior. En Juan Fernández (Masafuera). También en el Perú, Brasil, etc.

69. Familia SAPOTÁCEAS

Flores generalmente hermafroditas, radiadas. Cáliz típicamente de 5 divisiones imbricadas. Corola simpétala con 5 divisiones imbricadas, a veces provistas de apéndices. Estambres típicamente en dos verticilos quíntarios, fértiles o el exterior reducido a estaminodios. Anteras estrorsas. Hojas carpelares generalmente 5 o 10, reunidas en un ovario súpero; de 5 divisiones con un óvulo en cada celda. Estilo con el estigma poco marcado. Fruto una baya con una sola o con pocas semillas cuyo ombligo es dilatado; el embrión grande; el endospermio existe o falta.—Plantas leñosas con las hojas enteras i con las flores solitarias o por varias en las axilas de las hojas. El tegumento de pelos bifurcados. Canales de secreción en la corteza i en la médula.—31 jéneros principalmente tropicales; 1 en Chile.

Subfamilia de las *Palaquitas*

1. *Lucuma*.—Mol.

Cáliz de 5 divisiones. Corola con el tubo corto i de limbo de 5 divisiones de prefloracion anchamente imbricada. Estambres fértiles 5, opuestos a las divisiones de la corola; estaminodios 5, opuestos a las divisiones calicinales. Ovario 5-locular. Baya