

Subfamilia *Plumbaginaceas*.1. *Plumbago*.—L.

Cáliz tubuloso con el ápice 5-fido, membranoso entre las costillas prominentes, esteriormente cubierto de glándulas pediceladas. Corola hipocraterimorfa con el tubo cilíndrico i el limbo estendido, 5-fido. Estambres 5, libres de la corola. Ovario con el ápice atenuado. El extremo del estilo se parte en 5 estigmas plumosos. Cápsula (utrículo) encerrada en el cáliz, membranosa, abierta primero en una zona basal circular, en seguida en 5 valvas desde abajo hácia arriba. Embrion derecho con los cotiledones planos en el endospermio escaso.—Plantas perennes, ± leñosas, con las hojas alternas, enteras. Flores en espigas. Corolas azulejas, blancas o rojizas.—Ca. 10 especies de las rejiones tropicales i subtropicales; una en Chile, de la seccion *Plumbagidium* Sp.

* 1. *P. COERULEA* Kth. in H. B. Kth., Nov. gen. et spec. II pj. 220.—Gay V pj. 193; (*P. Humboldtiana* Roem. et Schult.; *P. rhomboidea* Hook.).

Arbusto con las ramas largas, mimbreadas, delgadas, flexuosas, lampiñas, con escepcion de los extremos glanduloso-viscosos (de las ramas floríferas). Hojas aovado-oblongas, atenuadas en ámbos extremos, con la ínfima base dilatado-auriculada, de un verde claro; de 2-4 cm. de largo. Brácteas glandulosas, aovadas, agudas. Cáliz con 2 hileras de glándulas en cada division, durante la floracion de 5-7 mm. de largo, despues mas largo i endurecido, cónico. Corola tierna, celeste, con el tubo un poco mas largo que el cáliz; el limbo de 5 divisiones aovadas, obtusas, ± acuminadas. Utrículo prismático. Tallos (a veces sarmentosos) de 1-2 m.

Provincia de Antofagasta (Taltal), de Atacama, (Huasco), de Coquimbo; en la zona litoral. Tambien en Colombia i el Perú. Setiembre, octubre.

Observacion. *P. scandens* L. (con el extremo de las ramas floríferas apenas glanduloso i las corolas blancas con el tubo del doble largo del cáliz) no se halla en Chile; *P. capensis* Thunb. es una planta frecuente de adorno.